

# بررسی اثرات امواج RF و میدان الکترومغناطیس حاصل از تابش MRI بر فرآیند فولیکولوژن در موش‌های صحرایی بالغ

جعفر آی<sup>۱،۲</sup>سعید سرکار<sup>۱</sup>محمد علی عقاییان<sup>۱</sup>

## خلاصه

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روز افزون استفاده از امواج الکترومغناطیس در صنعت و پزشکی، خصوصاً در دستگاه‌های تشخیصی مانند MRI، بررسی همه جانبه ای درباره اثرات میدان‌های الکترومغناطیس با شدت‌های مختلف بر فعالیت بافت‌ها و ارگان‌های مختلف ضروری بنظر می‌رسد. لذا بر آن شدیم تا تأثیر امواج RF و میدان الکترومغناطیس با شدت ۱/۵ تسلا که شدت مورد استفاده در اکثر دستگاه‌های تشخیصی MRI می‌باشد را بر فرآیند فولیکول زایی در موش‌های صحرایی بعنوان مدل حیوانی مورد مطالعه قرار دهیم.

**روش بررسی:** جهت این تحقیق تعداد ۲۲ رأس موش صحرایی بالغ ماده به سن ۸ هفته و به وزن  $20 \pm 200$  گرم از نژاد ویستار انتخاب شدند و ۱۱ رأس از آنها به مدت ۳۰ دقیقه تحت تأثیر امواج دستگاه MRI با شدت ۱/۵ تسلا همراه با امواج RF (Radiofrequency) با فرکانس ۶۳ مگاهرتز قرار گرفتند (گروه تجربی) و ۱۱ رأس از آنها تحت تأثیر امواج دستگاه MRI به مدت ۱/۵ تسلا و بدون امواج RF قرار گرفتند (گروه شاهد). پس از بیهوشی، خونگیری از قلب جهت اندازه‌گیری هورمون‌های استروژن، پروژسترون، FSH و LH انجام شد. در ضمن پس از لاپاراتومی حیوانات، تخمدان‌های آنها برداشته شد و تخمدان‌های خارج شده از بدن حیوانات پس از توزین و اندازه‌گیری قطر، بلافاصله در فرمالین بافر ۱۰٪ جهت انجام عملیات تهیه اسلاید قرار گرفتند و جهت شمارش انواع فولیکول‌ها از میکروسکوپ Olympus استفاده شد و تمام فولیکول‌های اولیه، ثانویه و بالغ موجود در اسلایدها بطور کامل با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر، مورد شمارش قرار گرفتند. داده‌های کمی حاصل از اندازه‌گیری‌های وزن و قطر تخمدان، تعداد انواع فولیکول‌ها و تغییرات سطوح هورمونی به کمک آزمون T-test تجزیه و تحلیل و  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

**یافته‌ها:** نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار  $p < 0.05$  در تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده بین گروه‌های تجربی و شاهد می‌باشد بجز در مقادیر هورمون LH و FSH که گروه تجربی کاهش معنی دار نسبت به گروه شاهد نشان داد.

**نتیجه‌گیری:** کاهش مقادیر LH و FSH در این تحقیق احتمالاً ناشی از تأثیرگذاری امواج الکترومغناطیسی بر سطوح بالای مغز (هیپوتالاموس) و آزاد سازی GnRH بوده و نهایتاً این تحقیق مؤید کم خطر بودن امواج دستگاه MRI جهت تصویربرداری می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** فولیکولوژن، پرتو الکترو مغناطیس، MRI، موش صحرایی

<sup>۱</sup>دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی  
<sup>۲</sup>دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری نوین پزشکی، گروه مهندسی بافت

نویسنده مسئول: دکتر جعفر آی، تلفن: ۰۹۱۲۵۱۵۰۲۹۶  
پست الکترونیک: jafar\_ai@tums.ac.ir

## مقدمه

گسترش و کاربرد وسیع دستگاه‌های مولد امواج الکترومغناطیس در زندگی روزمره به ویژه تجهیزات مدرن امروزی به انواع دستگاه‌های مولد این امواج وابسته است و گزارش‌های متعددی که در مورد اثرات زیانبار میدان‌های الکترومغناطیسی بر پدیده‌های رشد و نمو و بافت‌های مختلف بدن منتشر شده است، ضرورت مطالعه دقیق تر بخش‌هایی از طیف امواج الکترومغناطیس که کاربرد وسیع‌تری در زندگی روزمره انسان دارند را نشان می‌دهد. وسایل و تجهیزات مدرن از قبیل تلفن همراه، رایانه و ... به عنوان یکی از نیازهای انسان امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و روز به روز نیز به مخاطبان این قبیل ابزارها افزوده می‌شود. به اعتقاد متخصصان، این قبیل وسایل به عنوان

یکی از منابع تولید میدان‌های الکترومغناطیسی شناخته می‌شوند که تأثیرات متعددی نیز بر سلول‌ها و بافت‌های مختلف بدن انسان بر جای می‌گذارند [۱].

از آنجایی که میدان‌های الکترومغناطیسی تأثیرات فیزیولوژیکی چون افزایش متابولیسم بدن، انبساط عروق، پیگمانتاسیون، اثر بر روی اعصاب حسی (اثر تسکینی)، اثر بر روی بافت عضلانی، تخریب سلولی و بافتی، افزایش عمومی درجه حرارت بدن، کاهش فشار خون و در نهایت افزایش فعالیت غدد مترشحه عرق ارگانیسم بدن انسان دارند مانند اثرات فیزیولوژیک میدان‌های الکترومغناطیسی به بدن انسان به شمار می‌روند [۲]. همچنین میدان الکترومغناطیس، منجر به افزایش

دستگاه MRI به مدت ۱/۵ تسلا و بدون امواج RF قرار گرفتند (گروه شاهد).

پس از گذشت یک هفته از تابش بوسیله دستگاه MRI، موش‌های صحرایی به اتاق تشریح بخش کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) تهران برده شدند و پس از بیهوشی بوسیله کتامین، خونگیری از قلب جهت اندازه‌گیری هورمون‌های استروژن، پروژسترون، FSH و LH با استفاده از کیت آزمایشگاهی وبه روش رادیو ایمنواسی (RIA) به کمک دستگاه گاماکانتر انجام شد. در ضمن پس از لاپاراتومی حیوانات، تخمدان‌های آنها برداشته شد و تخمدان‌های خارج شده از بدن حیوانات پس از توزین بلافاصله در فرمالین بافر ۱۰٪ جهت انجام عملیات تهیه اسلاید قرار گرفتند و جهت تهیه نمونه‌های بافتی به ضخامت ۵ میکرون، بارعایت سریال سکشن به فاصله ۴۰ میکرومتر و رنگ آمیزی هماتوکسیلین وانوزین به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شدند. جهت شمارش انواع فولیکول‌ها و اندازه‌گیری قطر تخمدان‌ها از میکروسکوپ Olympus استفاده شد و تمام فولیکول‌های اولیه، ثانویه و بالغ موجود در اسلایدها بطور کامل با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر مورد شمارش قرار گرفتند.

داده‌های کمی حاصل از اندازه‌گیری‌های وزن و قطر تخمدان، تعداد انواع فولیکول‌ها و تغییرات سطوح هورمونی به کمک آزمون T-test تجزیه و تحلیل و  $p < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

### نتایج

در این تحقیق، اثر میدان الکترومغناطیسی با شدت ۱/۵ تسلا بر تغییرات غلظت گنادوتروپین‌ها در موش‌های صحرایی ماده بالغ مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که فقط هورمون‌های LH و FSH در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری در سطح  $P \leq 0.05$  داشت. همچنین هورمون‌های استروژن، پروژسترون، وزن و قطر تخمدان‌ها، تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه و بالغ در بین دو گروه تجربی و شاهد دارای تفاوت معنی داری در سطح  $P \leq 0.05$  نبودند. نتایج حاصل در جداول شماره ۱ تا ۳ و تصویر شماره ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱- مقایسه میانگین وزن و قطر تخمدان

میانگین قطر تخمدان (میلی متر)	میانگین وزن تخمدان (گرم)	معیار اندازه‌گیری شده گروه
۳/۱۱۶۴	۰/۰۰۷۸	گروه تجربی
$\pm 0.064$	$\pm 0.063$	
۳/۱۲۶۱	۰/۰۰۸۱	گروه شاهد
$\pm 0.245$	$\pm 0.213$	

غلظت رادیکال‌های آزاد در محیط شیمیایی می‌شود و بسیاری از تحقیقات پزشکی وجود رادیکال‌های آزاد غیر قابل کنترل را که به طور مستقیم باعث بروز مشکلات می‌شوند، نشان داده اند [۳]. رادیکال‌های آزاد قادرند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ترکیبات تمامی گروه‌های بیوشیمیایی شامل نوکلئیک‌ها، پروتئین‌ها، آمینو اسیدهای آزاد، لیپیدها و لیپو پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و ماکرو مولکول‌های بافت همبند آسیب برسانند [۴]. رادیکال‌های آزاد ممکن است فعالیت‌های سلولی مانند اعمال غشا، متابولیسم و بیان ژن را مختل کنند. امروزه مشخص شده است که رادیکال‌های آزاد باعث بیش از ۶۰ نوع بیماری می‌شوند که آلرژی‌ها، آلزایمر، آژن، آرتریت، آسم، بیماری مربوط به پروستات، کانسر، سیروز، التهاب بافت‌ها، آسیب کلیه، کبد، سکت، رتینوپاتی، پیری و... از جمله این موارد است [۵]. بیشتر یاخته‌هایی که در زمان تابش دهی در حال تقسیم هستند، تقسیم را ادامه می‌دهند و آنرا تکمیل می‌کنند ولی آن دسته که می‌خواهند به مرحله تقسیم بعدی وارد شوند ممکن است در مرحله G2 متوقف شوند. ساخت DNA نیز ممکن است به طور ناقص یا کامل در یاخته‌های مرحله S متوقف گردد. ضمناً از ورود یاخته‌های مرحله G1 به مرحله ساخت هم ممکن است ممانعت به عمل آید [۴]. از آنجاییکه تخمدان ارگانی است که دارای تقسیم میتوز و میوز بالا می‌باشد و همچنین روزانه بیماران زیادی از جمله خانم‌ها در سنین مختلف مخصوصاً زنان جوان و در سن بلوغ جهت تشخیص بیماری تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی با شدت ۱/۵ تسلا حاصل از دستگاه MRI قرار داده می‌شوند، بر آن شدیم تا تأثیر میدان الکترومغناطیسی با شدت ۱/۵ تسلا که شدت مورد استفاده در اکثر دستگاه‌های تشخیصی MRI می‌باشد را بر فرآیند فولیکول‌زایی در موش‌های صحرایی بعنوان مدل حیوانی مورد مطالعه قرار دهیم.

### روش بررسی

تعداد ۲۲ رأس موش صحرایی بالغ ماده به سن ۸ هفته و وزن  $20 \pm 200$  گرم از نژاد ویستار انتخاب شدند و به خانه حیوانات بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل گردیدند و به مدت ۱۰ روز جهت تطابق با شرایط محیطی نگهداری شدند. در این مدت شرایط فیزیکی بصورت تقریباً ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی بود، غذای آنها پلت از شرکت پارس دام و آب آشامیدنی آنها، آب آشامیدنی شهر تهران بود.


بعد از مدت مذکور حیوانات بوسیله قفس‌های نگهداری از موش‌های صحرایی به بخش تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند و ۱۱ رأس از آنها به مدت ۳۰ دقیقه تحت تأثیر امواج دستگاه MRI با شدت ۱/۵ تسلا همراه با امواج RF با فرکانس ۶۳ مگا هرتز قرار گرفتند (گروه تجربی) و ۱۱ رأس از آنها تحت تأثیر امواج

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین تعداد فولیکول‌های اولیه، ثانویه و بالغ

میانگین تعداد فولیکول‌های بالغ	میانگین تعداد فولیکول‌های ثانویه	میانگین تعداد فولیکول‌های اولیه	معیار اندازه گیری شده گروه
۱۰/۹۴۸	۸/۹۵۹	۵/۸۶۲	گروه تجربی
±۲/۲۳۴	±۳/۱۴۲	±۲/۵۱۶	
۱۱/۱۱۱	۸/۴۳۲	۶/۱۴۳	گروه شاهد
±۲/۲۳۴	± ۳/۱۳۱	۲/۹۷۶	

جدول شماره ۳- مقایسه تغییرات میانگین مقدار استروژن، پروژسترون، LH و FSH

گروه شاهد	گروه تجربی	گروه معیار اندازه گیری شده
۰/۴۵	۰/۱۱	میانگین مقدار FSH (mIU/ml)
±۰/۰۴	±۰/۰۵	
۰/۶۵	۰/۱۶	میانگین مقدار LH (mIU/ml)
±۰/۱۵	±۰/۱۲	
۹۱/۶	۷/۱۰	میانگین مقدار پروژسترون (ng/ml)
±۰/۲۸	±۰/۳۳	
۱۱/۷	۶/۸۱	میانگین مقدار استروژن (pg/ml)
±۰/۳۲	±۰/۲۱	



شکل شماره ۱- مقاطع میکروسکوپی از تخمدان موش صحرایی گروه شاهد (A) و گروه تجربی (B) به انواع فولیکول‌ها و تعدد آنها توجه فرمایید. مقاطع میکروسکوپی از تخمدان موش صحرایی گروه شاهد (C) و گروه تجربی (D) به فولیکول‌های بالغ و تعدد آنها و جسم زرد (فلش) توجه فرمایید، بزرگنمایی ۱۰۰ برابر

## بحث

دارد. در حالی که تجربیات Zeni نشان داده است و هنگامی که تخم‌های لقاح یافته تحت تابش میدان‌های الکترومغناطیس سینوسی قرار می‌گیرند، رشد و نمو آنها تسریع می‌شود [۱۳]. همچنین مطالعات Levin نیز مشخص نمود که میدان‌های الکترومغناطیس ثابت و متناوب قادرند چرخه میتوزی جنین‌های اولیه ارکین دریائی را تغییر دهند [۱۴] که این نتایج با نتایج حاصل از این تحقیق مغایرت دارد. اثر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس پائین بر توانایی تمایز و تکثیر اسپرماتوگونی‌های موش نیز توسط Furuya گزارش شده است [۱۵]. همچنین به نتایج Fesenko و Pirozzoli نیز می‌توان اشاره داشت [۱۶ و ۱۷] و این نتایج با نتایج تحقیق حاضر که نشان می‌دهد میدان‌های الکترو مغناطیس با شدت ذکر شده فرآیند تمایز فولیکول‌های موش را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، مطابقت داشته و با تجربیات Zmyslony که ایجاد رادیکال‌های آزاد را در نتیجه تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس دلیل تخریب سیستم‌های بیولوژیک و اختلال در رشد و نمو فولیکول‌ها می‌داند [۱۸]، مغایرت دارد.

از نتایج دیگر این تحقیق، عدم تأثیر میدان الکترومغناطیس به کار برده شده بر مقادیر پروژسترون و استروژن است که با نتایج Hjollund و همکاران که بر عدم تأثیر میدان‌های الکترومغناطیس بر هورمون‌های تولید مثلی تأکید دارند، [۱۹] مطابقت می‌کند. از طرف دیگر کاهش مقادیر LH و FSH در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد در این تحقیق، احتمالاً ناشی از تأثیرگذاری امواج الکترومغناطیس بر سطوح بالایی مغز (هیپوتالاموس) و تأثیر بر آزادسازی GnRH می‌باشد. مشاهده این تغییرات ممکن است ناشی از وضعیت فیزیولوژیک حیوان در موقع تیمار بوده باشد که اهمیت شرایط فیزیولوژیک حیوان در حین تیمار توسط Hyland نیز تأکید شده است [۲۰] زیرا در غیر این صورت تغییرات LH و FSH می‌بایست بر مقادیر پروژسترون و استروژن نیز تأثیر می‌گذاشت و متعاقباً باعث تغییر در فرآیند فولیکولوژن از جمله ازدیاد تعداد فولیکول‌ها نیز می‌شد. این بررسی نشان داد که دستگاه MRI تأثیرات معنی داری بر فرآیند فولیکولوژن در موش‌های صحرایی ندارد و مؤید کم خطر بودن دستگاه MRI جهت تصویر برداری بر تخمدان موش‌های صحرایی می‌باشد.

**نتیجه گیری:** در این تحقیق کاهش معنی دار در میزان هورمون‌های LH و FSH در گروه تجربی مشاهده گردید، این کاهش نتوانست تغییراتی را در تعداد فولیکول‌ها ایجاد کند ولی همین کاهش همراه با کاهش دیگر هورمون‌های بدن می‌تواند بسیار خطرناک باشد. پیشنهاد اینکه محققین تأثیر امواج الکترومغناطیس و RF حاصل از دستگاه MRI را بر روی هورمون‌های دیگر بدن ارزیابی نمایند.

اثرات میدان الکترومغناطیس بر غدد تناسلی و باروری توسط پژوهشگران بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است که می‌توان به تجربیات Mevissen اشاره نمود. این محقق اثرات میدان الکترومغناطیس ۵۰ هرتز را روی تولید مثل و رشد و نمو جنینی در رت‌ها مطالعه نمود. نتایج پژوهش وی نشان داده است که تعداد جنین‌های زنده در هر زایمان در گروه تجربی مربوط به میدان‌های الکترو مغناطیس، نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌دار یافته است اما این تغییرات در گروه تجربی معنی‌دار نبود [۶]. به علت کاربرد روز افزون دستگاه‌های مولد امواج الکترومغناطیس و اثرات احتمالی آنها بر فرآیندهای رشد و نمو موجودات زنده، مطالعه اثرات زیستی این امواج مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است [۷ و ۸]. در بررسی حاضر به بررسی اثر میدان الکترومغناطیس حاصل از دستگاه MRI با شدت ۱/۵ تسلا بر فرآیند فولیکولوژن و سطح سرمی هورمون‌های گنادوتروپین در موش‌های صحرایی پرداخته شد. همان‌گونه که از نتایج این تحقیق مشاهده می‌شود با تأثیر میدان الکترومغناطیس و امواج RF با شدت ذکر شده بر موش‌های ماده، اثرات معنی‌داری بر وزن و قطر تخمدان‌های موش‌های ماده تیمار مشاهده نشد. این نتیجه با گزارش Elebetieha مبنی بر افزایش شدید وزن تخمدان موش‌های ماده تیمار شده با میدان الکترومغناطیس تناقض دارد [۹] و احتمالاً این تفاوت به علت تغییر برخی پارامترهای مؤثر نظیر نژاد حیوان، شدت میدان الکترومغناطیس و مدت زمان تیمار می‌باشد. در پاره‌ای از مطالعات مربوط به ساختار بافتی تخمدان‌های موش‌های ماده تیمار شده با میدان الکترومغناطیس با شدت ۱۵ گاؤس، افزایش معنی‌داری در تعداد انواع فولیکول‌های تخمدانی نشان داده است. حصول این نتایج نشان می‌دهد که احتمالاً در شدت ۱۵ گاؤس میدان الکترومغناطیس، تقسیمات میتوزی سلول‌های جنسی اولیه افزایش یافته و روند میتوز تسهیل یافته است و در نتیجه باعث افزایش تعداد فولیکول‌ها در مراحل بعدی شده است [۱۰] که این نتایج با نتایج حاصل از این تحقیق مغایرت دارد. Valles نشان داد که میدان‌های مغناطیس بر طرح‌های تسهیم و جهت یابی مجدد دستگاه میتوزی مؤثر است [۱۱]. همچنین اثرات میدان‌های الکترومغناطیس بر سرعت تقسیم در چند مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله می‌توان به تجربیات Pagnac اشاره نمود وی با به کارگیری میدان‌های الکترومغناطیس متناوب و ثابت نشان داده است که اگر تخم‌های لقاح یافته ارکین دریائی را تحت تأثیر میدان الکترومغناطیس با شدت ۸ میلی تسلا قرار دهیم، تأثیری روی زمان اولین تقسیم کلیواژی ندارد [۱۲] و نتایج این تحقیق که میدان الکترومغناطیس بر تقسیم میتوز اثر نداشته است با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مطابقت

## منابع

1. Brent RL, Gordan WE, Bennett WR, Beckman DA. Reproductive and teratogenic effects of electromagnetic field. *Reprod Toxicol* 1993; 7: 535-80.
2. Russel JT, Reiter A. Review of neuroendocrine and neurochemical changes associated with static and extremely low frequency electromagnetic field exposure. *Integrative Psychological and Behavioral Science* 2007; 28(1): 57-75.
3. Crouzier D, Perrin A, Torres G, Dabouis V. Pulsed electromagnetic field at 9.71 GHz increase free radical production in yeast (*Saccharomyces cerevisiae*). *Pathologie Biologie* 2009; 57(3): 245-51.
4. Sobczak A, Kula B, Danch A. Effects of Electromagnetic Field on Free-Radical Processes in Steelworkers. Part II: Magnetic Field Influence on Vitamin A, E and Selenium Concentrations in Plasma 2002; 44(4): 230-3.
5. Patricia V, Aldo F, Marco A, David E, Leticia V. Effects of whole body exposure to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) on serum and liver lipid levels, in the rat. *Lipids in Health and Disease* 2007; 6(31): 177-86.
6. Mevissen M, Buntenkotten S. Effects of static and time-varying magnetic fields on Reproduction and fetal development in Rats. *Teratology* 1994; 50(3): 229-37.
7. Nakamura H, Matsuzaki I. Nonthermal effects of mobile-phone frequency microwaves on uteroplacental functions in pregnant rat. *Reproduction Toxicology* 2003; 17: 321-6.
8. Dasdage S, Akdag Z. Whole body exposure of rats to microwaves emitted from a cell phone does not affect the testes. *Bioelectromagnetics* 2003; 24(3): 182-8.
9. Elebetieha A, AL-Akhras M. Long-term exposure of male and female mice to 50HZ magnetic field: effects on fertility. *Bioelectromagnetics* 2002; 23: 168-72.
10. Denegre M, Valles M. Cleavage planes in frog egg are altered by strong magnetic fields. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998; 95: 14729-32.
11. Valles M. Model of magnetic field induced mitotic apparatus reorientation in frog egg. *Biophys J* 2002; 82(3): 1260-5.
12. Pagnac C, Genevriere M. No effects of DC and 60-Hz AC magnetic fields on the first mitosis of two species of sea urchin embryos. *Bioelectromagnetics* 1998; 19: 494-7.
13. Zeni O, Scarfi MR, Della Noce M, La Cara F, Bersani F, De Prisco PP. Influence of 50 Hz sinusoidal magnetic field on sea urchin embryogenesis. In: Bersani F editor. *Proceedings of the 2nd World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine*. Philadelphia: Kluwer academic/Plenum publisher 1999; 545-7.
14. Levin M, Ernst SG. Applied AC and DC magnetic fields cause alterations in the mitotic cycle of early Sea urchin in embryos. *Bioelectromagnetics* 1995; 16(4): 231-40.
15. Furuya H, Aikawa H. Flow cytometric analysis of the effects of 50HZ magnetic field on mouse spermatogenesis. *Nippon Eiseigaku Zasshi* 1998; 53(2): 420-5.
16. Fesenko E. Microwave and cellular immunity. *Bioelectrochemistry and Bioenergetics* 1999; (49): 29-35.
17. Pirozzoli MC. Effects of 50HZ electromagnetic field exposure on apoptosis and differentiation in a neuroblastoma cell line. *Bioelectromagnetics* 2003; 24: 510-6.
18. Zmyslony M, Jajre JM. The role of free radicals in mechanisms of biological function exposed to weak, constant and net magnetic fields. *Med Pr* 1998; 49(2): 177-86.
19. Hjollund NH, Skotte JH. Extremely low frequency magnetic fields and fertility a follow up study of couples planning first pregnancies. *Occup Environ Med* 1999; 56(4): 253-5.
20. Hyland G. Physics and biology of mobile telephony. *The Lancet* 2000; 356(9244): 1833-6.