

بررسی مقایسه‌ای تأثیر قابش پرتوهای لیزر کم‌توان در میزان درد و ناتوانی عملکردی ناشی از کمردردهای غیراختصاصی

خلاصه

مقدمه: کمردرد یک عارضه شایع در زندگی انسان امروزی است که میزان شیوع آن در جوامع بشری از دهه سوم زندگی تا ۶۰ سالگی افزایش یافته و در زنان بیشتر گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر لیزرهای کم‌توان بر کمردردهای غیراختصاصی است.

روش بررسی: پنج پایگاه اطلاعاتی PubMed, Ovid Medline, Cochrane Database Library, Web of Science, Ovid ACP (American College of Physicians) and RCT (Randomized Controlled Trial) and EBM (Evidence Base Medicine) گرفتند، پایگاه Web of Science از سال ۱۹۸۳ تا دسامبر ۲۰۱۵ و سایر پایگاهها از سال ۱۹۶۸ تا دسامبر ۲۰۱۵ جستجو شد. معیارهای ورود شامل بررسی هر نوع لیزر کم‌توان بر روی کمردرد، مطالعات انسانی، استفاده از گروه‌بندی تصادفی، وجود گروه کنترل، انتشار به زبان انگلیسی و در دسترس بودن مقاله به صورت کامل بود. معیارهای خروج عبارت بودند از: مطالعاتی که به صورت پایلوت و موردی انجام شده بودند و تحقیقاتی که متن کامل آن از طریق کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل دستیابی نبود. از ۷۱۴ خلاصه مقاله احتمالی، ۵ مطالعه معیارهای ورود به مطالعه را کسب کردند. این ۵ مطالعه توسط دو نفر از نویسندها به طور مستقل مورد استخراج اطلاعات قرار گرفت و پس از بررسی نقادانه به کمک معیار PEDro درجه‌بندی شدند.

یافته‌ها: سه مطالعه نتایج مثبتی از کاهش درد تحت تأثیر لیزر کم‌توان همراه با درمان‌های پایه و یا به تنها بی در کمردردهای مزمن و حاد گزارش کردند. یک مطالعه کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به کمردرد را تحت تأثیر لیزرهای کم‌توان متوسط، محدود و زودگذر اعلام کرد. در مطالعه دیگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در استفاده از لیزر کم‌توان و یا نوع پلاسبو در درمان کمردردها گزارش نگردید. به نظر می‌رسد لیزرهای کم‌توان می‌توانند موجب کاهش دردهای مکانیکی غیراختصاصی ناشی از کمردرد شوند. در رابطه با میزان بهبود و مدت ماندگاری تأثیرات حاصل از کاربرد پرتوهای لیزر کم‌توان مطالعات موجود کافی نیست و نیاز به پژوهش‌های بیشتری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: کمردرد، ناتوانی، لیزر کم‌توان، نوردرمانی

منور هادی‌زاده^۱

سیامک بشردوست تجلی^۲

محمد جواهريان^۱

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۲. دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۳. مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی، جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مقدمه

اطلاعات حاصل از این مطالعه به پژوهشگران و درمانگران امکان می‌دهد با بررسی میزان تأثیر این مداخلات بالینی و به کمک ویژگی‌های یافت شده درمان مناسب‌تری را برای بیماران مبتلا به کمردردهای مکانیکی با منشأ عضلانی - اسکلتی تجویز کنند.

هدف مطالعه

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر لیزر کم‌توان بر روی دردهای عضلانی - اسکلتی و همچنین تغییر عملکرد (Function) در ناحیه ستون فقرات کمری می‌باشد. (مطالعه مروری)

روش بررسی و نحوه جستجو:

در این مطالعه مروری ۵ پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی شامل Ovid ACP & RCT & EMB, Web of Science, Cochrane Database Library, Ovid Medline, PubMed مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر لیزر کم‌توان در کمردرد از ۱۹۶۸ تا ابتدای دسامبر ۲۰۱۵ مورد جستجو قرار گرفته است. کلیدواژه‌های مورد جستجو در این مطالعه با کمک Scopus Mesh انتخاب گردید. این Low Level Laser Therap*, LLLT, Low Power Laser, Low Level Laser Irradiation, Low Back Pain, Lumbago, Lumbar و Phototherap* Radiculopathy*, Lumbar Disc Herniation, Facet Syndrome, Lumbar Arthr*, Low Back Ache


از مجموع ۷۱۴ مقاله احتمالی به دست آمده از پنج پایگاه یادشده و به کمک بررسی اولیه خلاصه مقالات، تعداد ۶۸۸ مقاله به دلایل عدم ارتباط با موضوع مورد نظر مؤلفان، استفاده از لیزر پرتوان، استفاده از لیزر کم‌توان در اختلالات دیگر بجز کمردرد، متفاوت بودن نوع مطالعه با مطالعات مورد نظر مؤلفان و... حذف گردیدند. با حذف مقالات تکراری در پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوت، تعداد ۲۶ مقاله شرایط ورود به مطالعه را داشتند. از این تعداد ۱۵ مقاله به علت عدم دسترسی به متن کامل از طریق کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل ابتنای نبودند و از مطالعه خارج گردیدند. از تعداد ۱۱ مطالعه باقی‌مانده ۴ مطالعه به دلیل نداشتن گروه کنترل و ۲ مطالعه به علت بررسی لیزر آکپانچر از مطالعه کنار گذاشته شدند و درنهایت ۵ مطالعه قابلیت ورود به این جستجوی نظارمند را پیدا کردند (تصویر ۱). پنج مطالعه نهایی توسط دو نفر از نویسندها به طور مستقل از نظر کیفیت و روش تحقیق و براساس ۱۱ معیار درج شده در روش ارزیابی PEDro مورد بررسی قرار گرفته است. به هر معیار براساس بررسی مطالعه مورد نظر رتبه بله، خیر و یا نا واضح داده شد. نتایج حاصل از ارزیابی نقادانه و نمرات ذکر شده در مطالعه اخیر در موارد وجود اختلاف حاصل توافق بین دو نویسنده ارزیابی کننده می‌باشد.

اختلالات ستون فقرات یکی از رایج‌ترین مشکلات در بین جوامع فعال می‌باشد که از این بین مشکلات اسکلتی - عضلانی در ناحیه ستون فقرات کمری نسبت به دیگر خدمات شایع‌تر می‌باشد [۱]. به نظر می‌رسد که شیوع کمردرد از دهه سوم زندگی تا سنین ۶۰-۶۵ سالگی رو به افزایش می‌باشد و در بین زنان نسبت به مردان بیشتر است [۲]. کمردرد نسبت به سایر شرایط باعث ناتوانی عمومی بیشتری در افراد مبتلا می‌گردد و به عنوان یک مشکل حیاتی در سلامت عمومی درنظر گرفته می‌شود [۳-۴]. از نظر شرایط اقتصادی کمردرد به عنوان یکی از مشکلات هزینه‌بر در جوامع گوناگون شناخته شده است. در بررسی که در سال ۱۹۹۸ در انگلستان صورت گرفت، هزینه‌هایی که مستقیماً صرف درمان کمردرد می‌شود تنها برای یک سال ۱۶۳۲ میلیون پوند برآورد گردید [۵].

درمان‌های پیشنهادی برای کمردرد عبارت‌انداز: جراحی، درمان‌های دارویی و درمان‌های غیرتھاجمی مانند فیزیوتراپی و استفاده از ارتزهای کمکی. از بین این درمان‌ها میزان جراحی‌های ناحیه ستون فقرات کمری در چند سال اخیر به سرعت روبه‌افزایش بوده است [۱]. به نظر می‌رسد که درمان‌های غیرمداخله‌ای مانند فیزیوتراپی این توانایی را داشته باشند که کیفیت زندگی افرادی را که به مدت طولانی دچار کمردرد بوده‌اند، بهبود بخشد [۶].

امروزه، لیزر کم‌توان در برخی از مراکز فیزیوتراپی برای کاهش درد ناشی از مشکلات اسکلتی - عضلانی از جمله دردهای ناحیه ستون فقرات کمری مورد استفاده قرار می‌گیرند. لیزرهای مورد استفاده می‌شوند کلینیک‌های فیزیوتراپی که برای تسريع روند التیام استفاده می‌شوند شامل لیزرهای کم‌توانی می‌باشند که در انواع مختلف لیزر از کلاس ۱ تا B3 تقسیم‌بندی می‌گردند. سطح خروجی این لیزرهای کلasse ۴ و ۵ که برای جراحی و یا برش استفاده می‌شوند، متفاوت است [۷]. در بعضی مواقع از نام‌هایی نظیر Photobiomodulation و یا Photobiostimulation برای درمان بهوسیله لیزرهای مورد استفاده در کلینیک‌ها استفاده می‌شود که درواقع، مشخص‌کننده روش عمل این لیزرهای کم‌توان است [۷]. نتایج ضد و نقیضی درمورد تأثیر لیزرهای کم‌توان بر کاهش درد و بهبود عملکرد ناشی از اختلالات اسکلتی - عضلانی گزارش شده است [۷]. برخی گزارشات حاکی از کاهش قابل توجه درد در مشکلات مزمن مفصلی توسط لیزر کم‌توان می‌باشد [۸] و برخی موافق این تأثیر نیستند اگرچه ان را در بهبود عملکرد مؤثر می‌دانند [۹]. از طرف دیگر مدارک و مستندات کمی برای تأثیر لیزر کم‌توان بر روی برخی دیگر از عوارض اسکلتی - عضلانی مانند آرتروز مفصل زانو وجود دارد [۱۰].

باتوجه به نتایج ضد و نقیضی که درمورد تأثیر لیزرهای کم‌توان بر روی اختلالات اسکلتی - عضلانی وجود دارد و همچنین اهمیت کمردرد در جوامع امروزی، نیاز به بررسی دقیق‌تری در این زمینه احساس می‌شود.



شکل ۱: نمودار جستجوی نظاممند مطالعات

یافته‌ها

یافته‌های توصیفی

افراد شرکت‌کننده در این مطالعات همگی با تشخیص کمردرد تحت درمان قرار گرفته بودند ولی از نظر نوع کمردرد و علت ایجاد آن، افراد در مطالعات مختلف تفاوت داشتند. در یک مطالعه [۱۱] بیماران افرادی با کمردرد حاد همراه با درد رادیکولار و در مطالعه‌ای دیگر [۱۲] افراد موردنبررسی شامل گروه‌های کمردرد حاد و مزمن بودند که به علت فتق دیسک چهار دردهای ناحیه کمر شده بودند. در دو مطالعه دیگر [۱۳ و ۱۴] افراد مورد بررسی افرادی با کمردرد مزمن بودند. در آخرین مطالعه [۱۵] افراد تحت بررسی بیمارانی با درد در ناحیه کمر و بدون درد رادیکولار بودند که میزان حاد و یا مزمن بودن عارضه در آن‌ها گزارش نشده بود (جدول ۱).

نوع لیزر مورد استفاده در این مطالعات متفاوت بود. در دو مطالعه [۱۴ و ۱۱] از طول موج ۹۰۴ نانومتر لیزر کم‌توان به ترتیب با توان‌های ۴۰ mw و ۱۰۰ mw استفاده شدند و در دو مطالعه دیگر [۱۲ و ۱۳] از لیزر GaAlAs با دو طول موج و توان شامل به ترتیب ۸۱۰ نانومتر،

معیارهای ورود

مطالعات RCT (Randomized Control Trial) که تأثیر هرگونه لیزر کم‌توان را ببروی کمردرد در نمونه‌های انسانی بررسی کرده باشند و به زبان انگلیسی از سال ۱۹۶۸ تا ابتدای دسامبر ۲۰۱۵ به چاپ رسیده باشند. این مطالعات باستثنی از گروه‌بندی تصادفی استفاده کرده باشند و حتمی دارای گروه کنترل باشند و به وسیله کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت کامل قابل دستیابی باشند.

معیارهای خروج

۱. مطالعاتی که متن کامل آن‌ها از طریق کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دسترس نبودند.
۲. مطالعاتی که گروه کنترل (گروه پلاسبو یا گروه عدم درمان) را نداشتند.
۳. مطالعاتی که از لیزر آکوپانچر استفاده کرده بودند.
۴. کلیه مطالعات پایلوت و موردی

جدول ۱: خصوصیات بیماران و لیزر مورد استفاده و نوع مطالعه

کور بودن	وجود گروه کنترل	انتخاب Random	دیگری های لیزر	نوع کمربرد	سن(میانگین ± انحراف معیار) بر حسب سال			تعداد بیماران			نویسنده‌گان
					گروه عدم درمان	گروه پلاسیو	گروه درمان	گروه عدم درمان	گروه پلاسیو	گروه درمان	
دوسو کور	بله	بله	۹۰۴nm ۱۰۰mw ۳j/point	کمربرد حاد همراه با رادیکولوپاتی	۴۴,۸۴±۹,۲۲	۴۱,۸۷±۸,۳۷	۴۳,۵±۷,۷	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	Konstantinovic et al.(2010)
دوسو کور	بله	بله	(GaAlAS) ۸۱۰nm ۵۰mw ۲۷j/cm ²	کمربرد مزمن	-	۳۶	T1:۴۰ T2:۳۸	-	۲۰	T1:۲۰ T2:۲۱	Djavid et al.(2007)
دوسو کور	بله	بله	(GaAlAs) ۸۴۰nm ۱۰۰mw ۴۰j/cm ²	کمربرد حاد و مزمن ناشی از فتق دیسک (LDH)	-	P1:۴۵,۵۵±۱۵,۶۶ P2:۵۴,۷۵±۱۵,۰۲	T1:۴۸,۳۵±۱۵,۲۲ T2:۵۲,۲۵±۱۰,۷۷	-	P1:۲۰ P2:۲۰	T3:۲۰ T4:۲۰	Saime Ay et al.(2010)
دوسو کور	بله	بله	۵۴۲mw ۱,۰۶ μm	کمربرد بدون درد رادیکولار	-	۴۸,۲	۴۷,۸	-	۲۹	۲۷	Basford et al.(1999)
دوسو کور	بله	بله	(GaAs) ۹۰۴nm ۴۰mw ۴j/cm ²	کمربرد مزمن	-	۶۴,۳۳	۶۳,۲۰	-	۳۳	۳۸	Soriano et al.(1998)

T1(Treatment group 1):LLLT (low level laser therapy)

T2(Treatment group 2):LLLT + EXS

T3(Treatment group 1): Acute LDH (HP+LLLT)

T4(Treatment group 2): Chronic LDH (HP+LLLT)

P1(Placebo group 1): Acute LDH (HP+placebo LLLT)

P2(Placebo group 2): Chronic LDH (HP+placebo LLLT)

جدول ۲: تعداد جلسات درمان و زمان‌های ارزیابی و متغیرهای مورد اندازه‌گیری در هر مطالعه

متغیرهای مورد اندازه‌گیری	زمان‌های ارزیابی	زمان استفاده از لیزر کم‌توان	نویسنده‌گان
VAS Modified Schober Test Ostwestry Disability Questionnaire	قبل و بعد از اتمام جلسات درمان	۵ جلسه در هفته و در مجموع ۱۵ جلسه	Konstantinovic et al.(2010)
VAS Schober Test Ostwestry Disability Questionnaire	بعد از ۶ هفته اعمال مداخله و سپس بعد از ۶ هفته عدم اعمال مداخله	۲ جلسه در هفته و در مجموع ۱۲ جلسه	Djavid et al.(2007)
VAS Modified Schober Test Modified Ostwestry Disability Questionnaire Roland Disability Questionnaire	قبل و بعد از اتمام جلسات درمان	۵ جلسه در هفته و در مجموع ۱۵ جلسه	Saime Ay et al.(2010)
VAS Ostwestry Disability Questionnaire Modified Schober Test	قبل از جلسه اول و بعد از جلسات ۶ و ۱۲	۳ جلسه در هفته و در مجموع ۱۲ جلسه	Basford et al.(1999)
VAS	قبل و بعد از اتمام جلسات درمان	۵ جلسه در هفته و در مجموع ۱۰ جلسه	Soriano et al.(1998)

یافته‌های تخصصی

درد

در سه مطالعه [۱۱، ۱۴ و ۱۵] از مطالعات مورد بررسی لیزر مورداستفاده در مقابل لیزر پلاسبو یا عدم استفاده توانست میزان درد را کاهش دهد که دو مطالعه از این سه مطالعه که تأثیر ماندگارتری را داشتند از لیزر ۹۰۴ نانومتر استفاده کرده بودند. تأثیر کاهنده درد در یک مطالعه که در آن از طول موج $1/0.6 \mu\text{m}$ استفاده شده بود، محدود و زودگذر گزارش گردید [۱۵]. در مطالعه‌ای دیگر [۱۳] که از لیزر ۸۱۰ نانومتر استفاده شده بود، تفاوتی بین گروه لیزر و ورزش دیده نشد اما در گروه لیزر همراه با ورزش نسبت به گروه ورزش بهنهایی در طولانی مدت کاهش بیشتری یافته بود. در مطالعه دیگر [۱۲] که از لیزر ۸۵۰ نانومتر استفاده شده بود، تفاوت قابل توجهی بین گروههای لیزر و لیزر پلاسبو در کاهش درد گزارش نگردید. با توجه به نتایج ذکر شده از مطالعات مورد بررسی بهنظر می‌رسد که لیزر ۹۰۴ نانومتر برای کاهش درد می‌تواند نسبت به سایر لیزرهای مورد استفاده مؤثرتر باشد و تأثیر بیشتری را به همراه داشته باشد و با توجه به جلسات استفاده شده در مطالعات (جدول ۲) بهنظر می‌رسد حداقل جلسات مؤثر برای کاهش درد ۱۰ تا ۱۵ جلسه می‌باشد.

ناتوانی

در دو مطالعه [۱۱ و ۱۵] گروههای لیزر در مقابل لیزر پلاسبو تأثیر بیشتری در کاهش ناتوانی نشان دادند اگرچه در یکی از این دو مطالعه [۱۵] این تأثیر کاهنده درد محدود و زودگذر گزارش گردید. در مطالعه‌ای دیگر [۱۳] تفاوتی بین گروههای لیزر و ورزش دیده نشد ولی در گروه لیزر همراه با ورزش در مقابل گروه ورزش بهنهایی درد در مدت طولانی بهبود بیشتری را به همراه داشت. در مطالعه دیگر [۱۲] تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین گروههای لیزر و لیزر پلاسبو گزارش نگردید. با توجه به نتایج گزارش شده به نظر می‌رسد که لیزر ۹۰۴ نانومتر می‌تواند برای کاهش ناتوانی در افراد مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی با منشأ عضلانی - اسکلتی مؤثرتر واقع شود.

دامنه حرکتی

در دو مطالعه [۱۲ و ۱۵] تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دامنه حرکتی گروه لیزر و لیزر پلاسبو گزارش نگردید. در مطالعه دیگر [۱۱] بهبود دامنه حرکتی در گروه لیزر نسبت به گروه پلاسبو و همچنین گروه عدم استفاده از لیزر گزارش گردید. در مطالعه آخر [۱۳] بین گروههای لیزر تنها و ورزش تفاوتی دیده نشد ولی در گروه لیزر همراه با ورزش در مقابل ورزش بهنهایی بهبود بهتری گزارش گردید. با توجه به نتایج ذکر شده از مطالعات مورد بررسی اطلاعات کمی در ابعاد با تأثیر لیزر کم‌توان بر روی دامنه حرکتی افراد مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی با منشأ عضلانی - اسکلتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که لیزر ۹۰۴ نانومتر نسبت به

جدول ۳: نمرات معیار PEDro

نمرات مقياس PEDro	نویسنده‌گان
۱۱	Konstantinovic et al.(2010)
۹	Djavid et al.(2007)
۹	Saime Ay et al.(2010)
۸	Basford et al.(1999)
۹	Soriano et al.(1998)

۸۵۰ و ۵۰۰ نانومتر، 1000 mw استفاده گردیده بود. در مطالعه آخر [۱۵] از لیزر Nd-Yag با طول موج $1/0.6 \mu\text{m}$ استفاده شده بود که توان خروجی آن 542 mw بوده است (این مطالعه به عنوان اینکه از طرف نویسنده به عنوان لیزر کم‌توان در نظر گرفته شده بود، در مطالعه قرار گرفت) (جدول ۱). تعداد جلسات درمان در دو مطالعه [۱۲ و ۱۱] ۱۵ جلسه در طی ۳ هفته بود و در دو مطالعه دیگر [۱۳ و ۱۵] ۱۲ جلسه به ترتیب در طی ۴ و ۶ هفته بود. تعداد جلسات در مطالعه آخر [۱۴] ۱۰ جلسه در طی ۲ هفته گزارش گردیده بود (جدول ۲).

در تمام ۵ مطالعه مورد بررسی در به عنوان یکی از متغیرهای مورد اندازه‌گیری و با مقیاس VAS (Visual Analog Scale) مورد بررسی قرار گرفته بود. در ۴ مطالعه [۱۳، ۱۱-۱۳] دامنه حرکتی و ناتوانی نیز به عنوان متغیرهای مورد بررسی اندازه‌گیری شده بودند. از این دو متغیر دامنه حرکتی در یک مطالعه [۱۳] به وسیله Schober Test و در سه مطالعه دیگر [۱۱، ۱۲ و ۱۵] به وسیله Modified Schober Test تحت بررسی قرار گرفت. از نظر میزان ناتوانی در سه مطالعه [۱۳، ۱۱ و ۱۵] مطالعه Questionnaire Oswestry Disability Questionnaire مورد استفاده قرار گرفته و در مطالعه دیگر از [۱۲] به وسیله Modified Oswestry Disability و در مطالعه دیگر از [۱۱] به وسیله Roland Disability Questionnaire Questionnaire استفاده شده بود (جدول ۲). اطلاعات دقیق تر در ابعاد با مقالات مذکور در جداول ۱ و ۲ قابل دستیابی است. بررسی کیفی این مطالعات به کمک معیار PEDro و توسط دو نفر از نویسنده‌گان هریک بهنهایی (م.م و س.ب.ت) صورت گرفت که نتایج به غیراز دومورد با هم یکسان بود. محققان با بحث و بررسی مطالعات ذکر شده در زمینه اعلام نتایج یکسان برای دو مطالعه مذکور به توافق رسیدند (جدول ۳).

آن با نتایج مطالعه مؤلفان این مقاله نشان می‌دهند که تأثیر کاهنده در پرتوهای لیزر کم‌توان در تمامی خدمات عضلانی اسکلتی یکسان نیست. این اختلاف ممکن است تا اندازه‌ای به دلیل نوع صدمددگی و میزان تغییرات دئنراتیو در مفصل زانو در مقایسه با ستون فقرات کمری و یا نفاوت میزان گیرنده‌های حسی حساس به درد در این دو موضع باشد. دیگر تفاوت احتمالی شدت عوارض و مدت‌زمان درمان در مطالعات مذکور است.

نتایج حاصل از مطالعه مؤلفان این مقاله نشان می‌دهد که استفاده از لیزرهای کم‌توان همراه با درمان‌های دیگر تأثیر کاهنده ناشی از درد و احتمالاً میزان تأثیر این درمان‌ها را افزایش می‌دهند. استفاده از لیزرهای کم‌توان تا حدودی قادر است موجب کاهش دردهای ناحیه کمر ناشی از کمردردهای غیر اختصاصی گردد که این نتایج می‌تواند ناشی از تأثیرات خدالت‌هایی پرتوهای لیزر باشد. به‌نظر می‌رسد لیزرهای کم‌توان می‌توانند با تعديل پروسه و فاکتورهای التهابی به‌طور قابل توجهی درد حاد التهابی را کاهش دهند [۱۷ و ۱۸]. مکانیسم احتمالی دیگر برای این بهبود افزایش جریان خون موضع ناشی از تابش پرتوهای لیزر کم‌توان است [۱۹]. اگرچه ترشح مواد شبه افیونی کاهنده درد تحت تأثیر تابش پرتوهای لیزر هنوز به‌عنوان یک تئوری مطرح است [۲۰]. از طرف دیگر اثر ترمیمی تابش پرتوهای لیزر کم‌توان و افزایش میزان متوسط کلاژن در بافت‌های نرم تحت تابش می‌تواند علاوه بر کاهش درد موجب بهبود عملکرد این بیماران گردد [۲۱ و ۲۳]. مهم ترین محدودیت موجود در این مطالعه عدم دسترسی به متن کامل تعداد بسیاری از مقالات چاپ‌شده مرتبط با موضوع بود به‌نحوی که مطالعه اخیر را از حالت یک مطالعه سیستماتیک به یک مطالعه مروری منظم تغییر داد. محدودیت دوم، عدم بررسی تأثیر پرتوهای لیزرهای پرتوان برروی کمردرد و مقایسه تأثیر آن‌ها با نتایج حاصل از لیزرهای کم‌توان بود. محدودیت سوم این مطالعه بررسی مقالات چاپ‌شده تنها به زبان انگلیسی بود که باعث از دست دادن مقالات موجود ولی چاپ‌شده به زبان‌های دیگر نظری روسی گردید. محدودیت چهارم عدم بررسی تأثیر اختصاصی طول موج و انرژی‌های مختلف لیزر و مقایسه آن‌ها برای انتخاب بهترین پارامتر بود که ناشی از تعداد اندک مقالات در دسترس بود.

نتیجه کلی

به‌دلیل ناکافی و محدود بودن اطلاعات موجود، نتایج به‌دست آمده قابل تعمیم نیستند ولی به‌نظر می‌رسد که تابش لیزر کم‌توان می‌تواند موجب کاهش درد ناشی از کمردردهای عضلانی - اسکلتی در بیماران مبتلا به کمردردهای غیر اختصاصی گردد. در رابطه با گستردگی میزان این تأثیر، میزان ماندگاری بهبود و بررسی اثرات پلاسبو لیزر، تعیین دوز و یا طول موج مؤثر و تعداد جلسات مناسب و کافی برای استفاده از لیزرهای کم‌توان در کاهش دردهای ناحیه کمر مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

دیگر لیزرهای مورد استفاده در این زمینه مؤثرتر باشند. در هیچ‌یک از مطالعات فوق عوارض جانی برای استفاده از لیزرهای کم‌توان در درمان کمردردهای غیر اختصاصی ذکر نگردید به استثناء یک مطالعه [۱۵] که عوارض جانی ناچیزی در استفاده از لیزر کم‌توان با طول موج $106 \mu\text{m}$ گزارش گردید.

بحث

کمردرد یکی از اختلالات شایع ستون فقرات در جوامع جوان و میانسال می‌باشد [۱]. این عارضه باعث ایجاد ناتوانی در افراد می‌شود و زندگی روزمره را با مشکلاتی مواجه می‌کند، کمردرد به‌عنوان یکی از مشکلات حیاتی برای سلامت انسان‌ها شناخته شده است [۳ و ۴]. از لحاظ اقتصادی و هزینه‌های مستقیم درمانی کمردرد هزینهٔ سیار زیادی را به افراد و جامعه تحمیل خواهد کرد [۵]. امروزه، درمان‌های گوناگونی برای کمردرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به جراحی، درمان‌های دارویی و فیزیوتراپی اشاره کرد. در این مطالعه مروری سعی در بررسی اثرات تابش پرتوهای لیزر کم‌توان برروی کمردردهای غیراختصاصی با استفاده از مقاالت در دسترس گردیده است. نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که لیزرهای کم‌توان می‌توانند به‌عنوان یک درمان تکمیلی علاوه‌بر درمان‌های پایه مورد استفاده قرار بگیرند و موجب کاهش درد بیمار شوند. در تأثیر تابش پرتوهای لیزر کم‌توان در کاهش میزان ناتوانی افراد، برخی مطالعات نتایج بهتری را در گروه‌های تحت تابش پرتوهای لیزر گزارش کردند اگرچه این نتایج در پاره‌ای از موارد موقت گزارش گردید. مطالعات اندکی نشان دادند که تابش پرتوهای لیزر کم‌توان می‌تواند تا حدی موجب بهبود دامنه حرکتی گردد.

در یک مطالعه سیستماتیک که در سال ۲۰۰۸ منتشر یافته است [۱۶] تأثیر لیزرهای کم‌توان برروی کمردردهای غیر اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به‌دست آمده تقریباً با نتایج به‌دست آمده از مطالعه حاضر همسو بود. در مطالعه یادشده نشان داده شد که تابش پرتوهای لیزر کم‌توان ممکن است برخی تأثیرات کلینیکی را به همراه داشته باشد ولی برای انتخاب بهترین ویژگی‌های بالینی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری است. در مطالعه سیستماتیک یاد شده [۱۶] طول موج‌های مطرح در کاهش درد 904 نانومتر ، 830 نانومتر ، $106 \mu\text{m}$ گزارش گردید که با طول موج‌های یافته شده در مطالعه اخیر مشابه بود.

در یک مطالعه سیستماتیک و متانالیز دیگر [۱۰] تأثیر لیزرهای کم‌توان بر کاهش درد آرتروز در مفصل زانو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه سیستماتیک نشان داد که لیزرهای کم‌توان هیچ‌گونه اثر اولیه و یا ثانویه بر کاهش درد آرتروز مفصل زانو ندارند. در این مطالعه نیز از لیزرهای با طول موج‌های متفاوت 904 نانومتر ، 850 نانومتر و 830 نانومتر استفاده شده بود. نتایج حاصل از مطالعه یاد شده [۱۰] و مقایسه نانومتر استفاده شده بود.

References:

1. Andersson G. Epidemiological features of chronic low-back pain. *Lancet* 1999; 354: 581–5.
2. Meucci RD, Fassa AG, Faria N. Prevalence of chronic lowback pain: systematic review. *Rev Saude Publica* 2015; 49: 73-82.
3. STRINE TW, HOOTMAN JM. US National Prevalence and Correlates of LowBack and Neck Pain Among Adults. *Arthritis & Rheumatism* 2007; 57: 656-65.
4. Hoy D, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Bain C, Williams G, Smith E, Vos T, Barendregt J, Murray C, Burstein R, Buchbinder R. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis* 2014; 73: 968–74.
5. Maniadakis N, Gray A. The economic burden of back pain in the UK. *Pain* 2000; 84: 95-103.
6. Hemmilä HM. Quality of life and cost of care of back pain patients in Finnish general practice. *Spine (Phila Pa 1976)* 2002; 27: 647-53.
7. Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. *Electrotherapy Explained*. 4.ELSEVIER:London, 2006.
8. Bjordal J, Couppé C, Chow R, Tunér J, Ljunggren E. A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. *Australian Journal of Physiotherapy* 2003; 49: 107-16.
9. Chen J, Huang Z, GE M, Gao M. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of TMDs: a meta-analysis of 14 randomised controlled trials. *Journal of Oral Rehabilitation* 2015; 42: 291-9.
10. Huang Z, Chen J, Ma J, Shen B, Pei F, Kraus VB. Effectiveness of low-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. *Osteoarthritis and Cartilage* 2015; 23: 1437-44.

همچنین برای تعیین این نکته که پرتوهای لیزرها کم‌توان در کدام‌یک از انواع کمردرد تأثیر بیشتری در کاهش درد و یا بهبود عملکرد دارند، نیاز به مطالعات تكمیلی و بیشتری وجود دارد. با توجه به نتایج ذکر شده ۹۰۴ از مطالعات مورد بررسی به نظر می‌رسد لیزر کم‌توان با طول موج نانومتر نسبت به سایر لیزرها کم‌توان تأثیر بیشتری در کاهش میزان درد و ناتوانی عملکردی ناشی از کمردردهای غیراختصاصی دارد. به نظر می‌رسد برای کسب نتایج مطلوب حداقل نیاز به ۱۰ تا ۱۵ جلسه تابش پرتوهای لیزر می‌باشد.

- 11.**Konstantinovic LM, Kanjuh ZM, Milovanovic AN, Cutovic MR, Djurovic AG, Savic V, Dragin A, Milovanovic N. Acute Low Back Pain with Radiculopathy:A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Photomedicine and Laser Surgery 2010; 28: 553-60.
- 12.**Saime Ay, Dogan SK, Evcik D. Is low-level laser therapy effective in acute or chronic low back pain?.Clin Rheumatol 2010; 29: 905-10.
- 13.**Djavid G, Mehrdad R, Ghasemi M, Hasan-Zadeh H, Sotoodeh-Manesh A, Pouryaghoub G. In chronic low back pain, low level laser therapy combined with exercise is more beneficial than exercise alone in the long term: a randomised trial. Australian Journal of Physiotherapy 2007; 53: 155-60.
- 14.**Soriano F, Rios R. Gallium Arsenide Laser treatment of chronic low back pain:a prospective, Randomized and Double Blind study.laser therapy 1998; 10: 175-80.
- 15.**Basford R,Shefield C, Harmsen W. Laser Therapy: A Randomized, Controlled Trial of the Effectsof Low-Intensity Nd:YAG Laser Irradiation on Musculoskeletal Back Pain. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80: 647-52.
- 16.**Yousefi-Nooraie R, Schonstein E, Heidari K, Rashidian A, Akbari-Kamrani M, Irani S, Shakiba B, Mortaz Hejri S, Mortaz Hejri S, Jonaidi A. Low level laser therapy for nonspecific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008; 2.
- 17.**Bjordalj,Johnson M,Iversen V,Aimbire F,Lopes-Martins R. Low-Level Laser Therapy in AcutePain: A SystematicReview of Possible Mechanisms of Action and ClinicalEffects in Randomized Placebo-Controlled Trials. Photomedicine and Laser Surgery 2006; 24: 158-68.
- 18.**Sakurai Y, Yamaguchi M, Abiko Y. Inhibitory effect of low-level laser irradiation on LPS-stimulated prostaglandin E2 production and cyclooxygenase-2 in human gingival fibroblasts. Eur J Oral Sci 2000; 108: 29-34.
- 19.**SCHINDL A, SCHINDL M, SCHÖN H, KNOBLER R, HAVELEC L, SCHINDL L. Low-Intensity Laser Irradiation Improves Skin Circulation in Patients With Diabetic Micro angiopathy. DIABETES CARE 1998; 21: 580-4.
- 20.**Hagiwara S, Iwasaka H, Hasegawa A, Noguchi T. Pre-Irradiation of Iood by Gallium Aluminum Arsenide (830 nm) Low-Level Laser Enhances Peripheral Endogenous Opioid Analgesia in Rats. International Anesthesia Research Society 2008; 107: 1058-63.
- 21.**Feitosa M, Carvalho A, Feitosa V, Coelho I, OliveiraV R, ArisawaV E. Effects of the Low-Level Laser Therapy (LLLT) in the process of healing diabetic foot Ulcers. Acta Cirúrgica Brasileira 2015; 30: 852-7.
- 22.**Carvalho P, Mazzer N, Reis F, Belchior A, Silva I. Analysis of the influence of low-power He-Ne laser on the healing of skin wounds in diabetic and non-diabetic rats. Acta Cirúrgica Brasileira 2006; 21: 177-83.
- 23.**Skinner SM, Gage JP, Wilcet PA, Shaw RM. A preliminary study of the effects of laser radiation on collagen metabolism in cell culture. Australian Dental Journal 1996; 41: 188-92.